

## ***Latrodectus mactans* - Southern Black widow**



**Tänk på att spindeln är rejält giftig!!!**

Arten lever i södra delen av USA.

Man kan hitta spindeln i biotoper med gräs, torra områden och öken.

Honor blir ca 8 – 10 mm stora hanarna 4 – 5 mm.

Spindlarna är inte direkt aggressiva, men försvarar sig om de blir trängda, honor som vaktar sina kokonger är riktigt alerta.

Änkan spinner ett tredimensionella nät för att fånga sina byten.

Trots att artens gift ( latrotoxin<sup>1</sup>) är riktigt farligt är antalet dödsfall bland friska vuxna ovanligt. Risken för att bett kan leda till döden är störst hos barn och överkänsliga vuxna.

### **Föda**

De flesta foderinsekter och de äter mycket.

När ungarna kläcks äter de bananflugor, efterhand som de växer kan man byta ut foder djuren mot större.

Vill dock varna för syrsor, då syrsor har en benägenhet att äta på ömsande spindlar och detta slutar ofta med att spindeln dör.

### **Terrariet**

Terrariet måste vara helt rymningssäkert, spindlarna får inte under några omständigheter rymma!!!!

Jag håller mina änkor i terrarier eller burkar på minst 17 x 10 x 10 cm.

Som bottenstrat har jag natur- eller cocostorv. Dusch terrariet lätt någon gång per vecka, men bottenstrat får inte bli blött.

Håll Ca 22 – 28 c, man kan med fördel låta temperaturen sjunka något på natten.

### **OBS!**

Glöm inte att djuret har ett riktigt skarpt gift, handskas **alltid** med djuret med stor respekt och försiktighet. Ta för vana att **aldrig** hantera dina giftiga djur om du är stressad, trött eller onykter.

---

<sup>1</sup> Djurens gifter, Anders Edström, Studentlitteratur 1988, ISBN 91 – 44 – 27691 - 5